

# INFLUNews


Dall'11 al 17 gennaio 2010

seconda settimana


in collaborazione con la Sezione di Virologia dell'Università degli studi di Milano, diretta dal Prof. Zanetti e il Centro Interuniversitario di Ricerca sull'Influenza e sulle infezioni Virali (CIRI-IV)

## La diffusione dell'influenza in Lombardia

Nessuna variazione di rilievo nella seconda settimana del 2010: l'incidenza di sindromi influenzali si attesta su un valore inferiore a quello considerato basale (1,16 per mille).



Solo per i bimbi tra 0 e 4 aa si osserva un incremento (da 1,6 x mille della scorsa settimana a 3,7), mentre nelle altre fasce di età la situazione resta invariata.



Anche nella scorsa settimana, come nella precedente, nessuno dei tamponi faringei inviati dai medici sentinella è risultato positivo per virus influenzali. In ogni caso, anche visionando [i dati di sorveglianza virologica italiani](#) ed [europei](#) si può verificare che tra i virus isolati di tipo influenzale predomina quasi esclusivamente A/H1N1v (il primo tampone positivo per virus influenzale stagionale A/H3 è stato isolato a Padova nella 50ma settimana 2009). La nuova influenza dunque continua ad essere un potenziale rischio, seppure con bassa probabilità, per coloro che non l'hanno ancora contratta.

## VACCINAZIONE CONTRO A/H1N1v

L'organizzazione mondiale della sanità ha stabilito che il vaccino antinfluenzale da utilizzare nell'emisfero sud, da maggio a ottobre 2010 (la stagione autunno-invernale decorre in tale periodo e in esso si verifica l'epidemia influenzale stagionale), dovrà comprendere anche il virus A/H1N1v della nuova influenza (denominato in termini virologici: A/California/7/2009 (H1N1)-like virus).

**Dal 14 al 18 febbraio è invece convocato il Comitato per la definizione della composizione del prossimo vaccino antinfluenzale stagionale per l'emisfero nord (da utilizzare da ottobre 2010 ad aprile 2011).**

Il vaccino contro la nuova influenza è ancora disponibile per tutti i soggetti (bambini oltre i 6 mesi di vita, adulti e anziani senza limite di età) con malattie croniche o invalidità, per le donne in gravidanza, per i familiari e coloro che assistono persone malate o disabili, per gli operatori sanitari e di tutti i servizi e attività importanti per la collettività, comprese le forze dell'ordine, per i donatori di sangue. **Benchè il picco di maggior incidenza si sia già verificato è comunque importante vaccinarsi contro la nuova influenza, perché il virus continua a circolare e molte persone non sono state ancora contagiate.**

Per sapere dove, come e quando farsi vaccinare è sufficiente contattare la propria asl:

Azienda Sanitaria Locale	N° telefonico	ORARI (dal lunedì al venerdì)
Bergamo	800 002233	dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Brescia	800 777346	dalle ore 8.00 alle ore 17.00
Como	031 370111	dalle ore 9.00 alle ore 17.00
Cremona	800 417330	dalle ore 8.30 alle ore 15.00
Lecco	800 512328 o 0341 482604	dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Lodi	0371 5872492	dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.30
Mantova	800 384384	dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Milano	02 85788080	dalle ore 9.00 alle ore 16.00
Milano 1	800 671671	dalle ore 9.00 alle ore 17.00
Milano 2	848 800507	dalle ore 9.00 alle ore 17.00
Monza Brianza	800 276775	dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Pavia	800 034933	dalle ore 9.00 alle ore 16.00
Sondrio	0342 555427	dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 14 alle ore 16
Varese	800 769622	dalle ore 9.00 alle ore 16
Valle Camonica Sebino	800 076323	dalle ore 9.00 alle ore 12,30 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00

*Per saperne di più:*

[Influenza A/H1N1 - informazioni da Regione Lombardia](#)

[influenzah1n1@regione.lombardia.it](mailto:influenzah1n1@regione.lombardia.it)